کاربردهای استخراج DNA در باستان شناسی



● دکتر داریوش فرهود
متخصص ژنتیک، کلینیک ژنتیک، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه علوم پایه/ اخلاق، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تهران، ایران



● ندا گلچین
کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوشیمی، کلینیک ژنتیک



● پرنیان نادری
دانشجوی کارشناسی زیست سلولی و مولکولی، کلینیک ژنتیک



● فرشته خلیل زاده
کارشناس ارشد سلولی مولکولی
کلینیک ژنتیک

چکیده

زمینه: مرحله نخست در آزمایش‌های ژنتیکی، معمولاً استخراج DNA با کیفیت بالا است. Feriedrich Miescher در سال ۱۸۶۹ میلادی طی مطالعه‌ای که روی ترکیب سلولی انجام داد،DNA را کشف و آن را از لکوسیت ها جدا کرد و نام آن را «نوکلئین» گذاشت Mazelson و Stahl یک روش استاندارد استخراج DNA را در سال ۱۹۵۸ میلادی با استفاده از سانتریفیوژ گرادیان چگالی نمک بر روی نمونه‌های E. coli معرفی کردند. متعاقباً، تکنیک‌های استخراج DNA برای منابع مختلف بیولوژیکی اصلاح شدند.

روش کار: روش‌های استخراج DNA به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می‌شوند. روش‌های فیزیکی شامل خرد کردن نمونه است، در حالی که روش‌های شیمیایی با استفاده از موادی نظیر سلول‌های کشت بافت، نمونه‌ها را به راحتی لیز می‌کنند. همچنین، کیت‌های تجاری فرآیند استخراج DNA از منابعی مانند گلبول‌های سفید، مو، استخوان، بزاق، ناخن، پوست و سایر سلول‌های هسته دار را ساده کرده و باعث افزایش سرعت و دقت در انجام این فرآیند شده‌اند.

یافته‌ها: تجزیه و تحلیل DNA برای تعیین ویژگی‌های جمعیت شناختی و ژنتیکی و همچنین شناسایی افراد ناشناس بسیار مهم است. پیشرفت‌های اخیر در تجزیه و تحلیل DNA، این فناوری را قابل دسترس کرده و به باستان شناسان، انسان شناسان و متخصصان پزشکی قانونی این امکان را داده است که داده‌های ژنتیکی قابل اعتماد را از بقایای باستانی استخراج کنند.

نتیجه‌گیری: هدف این مقاله بررسی کاربرد روش‌های آزمایشگاهی استخراج DNA در باستان شناسی است. پیشرفت‌های تکنولوژیک و استفاده از کیت‌های تجاری، استخراج DNA از بقایای باستانی را تسهیل کرده و نقش مهمی در تحقیقات باستان شناسی و سایر علوم مرتبط ایفا می‌کند.

کلید واژه: استخراج، DNA، باستان، نسب، استخوان، PCR

مقدمه

با گسترش دانش ژنتیک و علوم آزمایشگاهی، شناخت ماده حیاتی سلول-DNA و ساختار شگرف آن که در واقع یک بارکد طبیعی و منحصر به فرد حامل اطلاعات وراثتی افراد است، امکان‌پذیر شد. امروزه، استفاده از دستاوردهای مهندسی ژنتیک و روش‌هایی مانند DNA Typing یا انگشت نگاری ژنتیکی جهت تشخیص هویت افراد، کشف حقایق باستان شناسی، تعیین جنسیت و به ویژه بررسی رابطه نسبی بین افراد به لحاظ کشف واقعیت، امری مسلم و غیرقابل انکار است(۳-۱).


[Downloaded from labdiagnosis.ir on 2026-11-12]

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز[1] یکی از مهم‌ترین روش‌های تشخیصی مولکولی مدرن است که ما را قادر می‌سازد تا به بررسی ابعاد مختلف مولکولی یک یاخته بپردازیم. این روش با استفاده از تکثیر بخش‌های اختصاصی ژنوم پروکاریوتی و یوکاریوتی، امکان تعیین گونه، نژاد و تاریخچه یاخته را فراهم می‌آورد (۵-۴).

توالی ژنومی یا همان DNA در فرآیند تشخیص با این روش اهمیت ویژه‌ای دارد، به نحوی که وجود هرگونه مهار کننده به همراه DNA، کیفیت پایین DNA استخراج شده با توجه به شکنندگی DNA باستانی، عدم رعایت دمای استخراج و یا شرایط pH استخراج DNA نقش بسیار مهمی در موفقیت آزمون ایفا می‌کند. اغلب روش‌های موجود برای استخراج DNA از نمونه‌های بافت طبیعی و یا DNA به هم پیوسته با وزن مولکولی بالا طراحی شده‌اند، در حالی که نمونه‌های باستانی غالباً حاوی DNA شکسته با وزن مولکولی پایین و به مقدار بسیار کم و همچنین انواع مختلفی از مهارکننده‌های آزمون واکنش زنجیره‌ای پلیمراز هستند (۹-۶). لذا، روش استخراج مناسب برای این نوع DNA باید به دور از انواع محلول‌های شوینده قوی، تغییرات دمایی بسیار زیاد باشد (۱۰و۱۱).

نقش استخراج DNA در اثبات نسب

بررسی مولکول DNA، که به انگشت نگاری ژنتیک نیز معروف است، برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ میلادی توسط دکتر آلیستر جفرسون[2] به منظور استفاده در تشخیص هویت مطرح شد و پس از آن به طور گسترده‌ای در تحقیقات قانونی مورد استفاده قرار گرفت. (تصویر ۱) در حقیقت، جفرسون مشخص کرد که در زنجیره DNA، هزاران توالی یکسان وجود دارد که طول، نوع باز و تعداد تکرار این توالی‌ها در هر فرد متفاوت و منحصر به فرد است. بنابراین، شناسایی و نشان دادن توالی نوکلئوتیدها در سلول، اساس شناسایی DNA است. در واقع، روش تعیین توالی اجزای تشکیل‌دهنده مناطق تکرار شونده کوتاه[3]، مبنای آزمایش DNA است که به آن DNA Typing نیز گفته می‌شود (۱۲).



تصویر ۱: انگشت نگاری DNA روشی است که در آزمایشگاه‌ها برای شناسایی افراد بر اساس توالی‌های نوکلئوتیدی منحصر به فرد در DNA آن‌ها استفاده می‌شود. معمولاً در تحقیقات جنایی، پزشکی قانونی و آزمایش پدری برای مطابقت با نمونه‌های DNA افراد شناخته شده و ناشناس استفاده می‌شود (۱۳).

آزمایش DNA بر مبنای تعیین و مقایسه توالی‌های اجزای تشکیل دهنده مناطق تکرار شونده از طریق روش‌های بررسی مولکولی مانندStR ، چند ریختی طول قطعه بریده شده [4] و تفاوت در تعداد قطعات پشت سر هم [5] به تعیین رابطه نسبی بین افراد می‌پردازد. معیار این بررسی، تشخیص تجانس بین پدر احتمالی و فرزند از طریق مقایسه تکرار توالی‌های بازها در DNA دو فرد است (۱۲).

تاریخچه مطالعه DNA باستانی


اصطلاح DNA باستانی برای اولین بار در مطالعات یافته‌های باستانی در سال ۱۹۸۰ مطرح شد، (۱۴) و از زمان کشف آن در سال ۱۹۸۹، بر روی مولکول‌های استخوانی و یا مولکول‌های حفظ شده در بافت ها مورد مطالعه قرار گرفت. به طور کلی، DNA باستانی تأثیر به سزایی بر باستان شناسی نگذاشت. این مساله شاید به دلیل اقدام‌های پیشگیرانه دقیقی بود که باید برای جلوگیری از آلودگی انسانی نمونه‌ها با DNA مدرن انجام می‌شد و تا سال ۱۹۹۵، درک دقیقی از آن حاصل نشد (۱۵).

1- Polymerase chain Reactiom(PCR)
2- Alec Jeffreys
3- Short Tandem Repeat(StR)
4- RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)
5- VNTR(Variable Number Tandem Repeats)

[Downloaded from labdiagnosis.ir on 2026-11-12]

گزارش‌های منتشر شده در زمینه باستان شناسی و دیرینه شناسی به دلیل عدم اطمینان از فرآیندهای استخراج نمونه‌های باستانی، نمی‌توانستند سندی معتبر از آزمایش‌های باستانی آن زمان باشند. (تصویر۲)

در حال حاضر، چالش بر سر سهولت این روندهاست، به‌گونه‌ای که بتوان آن‌ها را از آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی مولکولی بیرون آورده و در محیط باستان‌شناسی و دست دانشمندان باستان‌شناس قرار داد.(۱۶)



تصویر۲: تصویر شماتیک از فرآیند استخراج DNA باستانی و ساخت کتابخانه. عصاره‌های تهیه شده از استخوان خرس غار حاوی DNA خرس غار (قرمز) و مخلوطی از DNA های موجودات دیگر (خاکستری) است (۱۷).

عوامل مؤثر در انتخاب DNA باستانی

بررسی یافته‌های گیاهی، دانه‌ها و گرده‌های گیاهی: مطالعه روی یافته‌های گیاهی که از یک کاوش باستانی به دست می‌آید، می‌تواند در مطالعات زیست محیطی و شناسایی گونه‌های فصلی گیاهان آن منطقه کمک‌کننده باشد. به علاوه، مطالعات گیاهی در یک کاوش باستانی اطلاعات مفیدی در مورد قدمت آن منطقه ارائه می‌دهد.

بررسی یافته‌های جانوری: بررسی DNA باستانی در زمینه مطالعه استخوان‌های جانوری در باستان شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث حل مسائل تکاملی، زیست محیطی و دیرینه جغرافیایی مناطق می‌شود.

بررسی آسیب‌ها و علت مرگ در گورهای دسته جمعی: برای درک بهتر نوع و علت مرگ و مطالعه روی بیماری‌های باستانی، بررسی آسیب‌ها و علت مرگ در گورهای دسته جمعی بسیار سودمند است.

بررسی‌های پزشکی قانونی: بررسی و مطالعات پزشکی قانونی می‌تواند شامل قربانیان جنگ ویتنام یا قربانیان بلایای طبیعی باشد. این مطالعات در زمینه‌های مختلف بسیار مفید واقع شده‌اند.

بررسی‌های انسان‌شناسی: بررسی DNA باستانی می‌تواند در مطالعه بقایای اسکلتی یافت شده از مناطق باستانی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، مطالعه DNA در بررسی‌های یک محوطه تاریخی یا یک گور دسته جمعی در زمینه روابط خویشاوندی، قومیت‌ها و اجداد مشترک اطلاعات سودمندی فراهم می‌آورد (۱۸).

استخراج DNA در باستانی

ژنتیک جمعیت: با تحلیل DNA باستانی، پژوهشگران می‌توانند تنوع‌های ژنتیکی را ردیابی کرده و الگوهای مهاجرت، نژاد و تعاملات بین جمعیت‌های باستانی را درک کنند.

سلامت و بیماری: تحلیل DNA می‌تواند به درک سلامت و بیماری‌های جمعیت‌های باستانی کمک کند. برای مثال، شناسایی نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با بیماری‌های خاص می‌تواند به محققان کمک کند تا شیوع این شرایط را در جوامع باستانی درک کنند و تاثیرات آن‌ها بر زندگی مردم آن زمان را بررسی نمایند. از شناسایی افراد در گورهای دسته جمعی گرفته تا تأیید اصالت آثار تاریخی، تحلیل ژنتیکی می‌تواند شواهد مهمی را فراهم کند و به روشن شدن حقایق تاریخی و فرهنگی کمک کند. (تصویر ۳)

به طور کلی، مطالعات DNA در بررسی یک محوطه تاریخی یا گور دسته جمعی می‌تواند اطلاعات مفیدی در زمینه‌های مختلفی از جمله روابط خویشاوندی، بررسی قومیت‌ها و شناسایی اجداد مشترک ارائه دهد. این اطلاعات به درک بهتر از ساختار اجتماعی، فرهنگی و ژنتیکی جوامع باستانی کمک می‌کند. (۱۹)

تفاوت میان DNA باستانی و DNA مدرن

DNA یک مولکول پایدار نیست و در صورت عدم وجود سیستم‌های ترمیم، آسیب دیدگی‌های ناشی از عوامل شیمیایی و فیزیکی می‌تواند به طور جدی به این مولکول آسیب برساند. یکی از مخرب‌ترین عوامل فیزیکی برای DNA، حرارت است. تأثیر حرارت بر مولکول‌های آب، که از پیوند های اساسی ساختار DNA می‌باشد، منجر به تحریک پیوندهای کووالانسی می‌شود. این پیوندها اجزای اساسی نوکلئوتیدها را به بقیه ساختار DNA متصل می‌کنند. در نتیجه، آسیب حرارتی باعث ناپایداری و تجزیه DNA می‌شود و رشته DNA در نواحی آسیب دیده شکسته می‌شود. روزانه حدود ده هزار مورد از این آسیب‌ها در DNA هر سلول انسانی رخ می‌دهد، اما در سلول‌های زنده، حداقل نه هزار

[Downloaded from labdiagnosis.ir on 2026-11-12]

و نهصد و نود و نه مورد از این آسیب‌ها قبل از شکستن رشته‌ها ترمیم می‌شوند. پس از مرگ، فرآیندهای ترمیم متوقف شده و شکستگی‌های رشته‌های DNA بدون کنترل ادامه می‌یابد. شکستگی رشته‌ها در نمونه‌های مرطوب سریع‌تر از نمونه‌های خشک رخ می‌دهد (۱۹). واضح است که مولکول‌های DNA باستانی بسیار کوتاه‌تر از همتایان مدرن خود هستند. این کوتاهی مولکول‌های DNA باستانی به خودی خود مشکل جدی به شمار نمی‌آید چرا که اطلاعات کافی برای شناسایی ویژگی‌های زیستی مانند جنسیت، تعیین خویشاوندی و قرابت معمولاً از مولکول‌هایی به طول ۱۰۰ تا ۱۵۰ جفت باز قابل استخراج است. حتی اگر تعداد مولکول‌های با این طول در حال حاضر بسیار کم باشد، می‌توان با تولید نسخه‌های متعدد از آن‌ها به روش PCR مورد بررسی قرار داد .

پوسیدگی DNA پس از مرگ و چالش‌های مرتبط با مطالعه DNA باستانی

در بهترین شرایط عوامل محیطی از جمله تغییرات ناگهانی دمایی، غلظت‌های نمک و یا خشک بودن اقلیم هوایی در محیط که جزء کمترین آسیب‌های محیطی به حساب می‌آید سبب شده نوکلئازها از بین بروند و یا قبل از تغییر اسید نوکلئیک به مونونوکلئوتید غیرفعال تبدیل شوند. به علاوه دآمیناسیون، دپورینه شدن و دیگر فرآیندهای هیدرولیتیک باعث بی ثباتی و شکست مولکول‌های DNA می‌شوند. اطلاعات ژنتیکی که از DNA استخوان‌های انسانی به دست می‌آیند می‌توانند به مطالعه ارتباطات موجود بین اقوام و در ابعاد کوچک‌تر، گروه‌ها و افراد مدفون در یک گورستان کمک کنند؛ به علاوه می‌تواند در تعیین جنسیت اسکلت‌ها مفید باشد. (۲۱) در مطالعه پالئوپاتولوژی روی نمونه‌های استخوانی می‌توان به بیماری‌های ارثی و همچنین بیماری‌های عفونی که سبب آلودگی DNA موجود در استخوان‌ها شده‌اند پی برد. امروزه تکثیر مولکول‌های DNA بالای یک میلیون سال پیش، بیش از حد خوش بینانه است. (۲۲)

ساختار و ماهیت یک مجموعه استخوانی باستانی

راه‌های مختلفی که برای تدفین به طور معمول توسط گروه‌های مختلف مردم در نقاط مختلف جهان به کار می‌رود، به طور معمول شامل رها کردن جسد در رودخانه‌ها، قرار دادن اجساد روی درخت‌ها و یا نقاط بلند و یا رها کردن اجساد برای خورده شدن توسط حیوانات وحشی هستند. این روش‌ها بقایای کمی را برای ثبت در مطالعات باستان شناسی به جا می‌گذارند. تنها در مواردی که آیین‌های تدفین منجر به قرار دادن بقایای انسانی در زیر خاک یا داخل معابد شده باشد، می‌توان آن‌ها را پس از گذشت قرن‌ها یافت و توسط باستان شناسان مورد بررسی قرار داد. در بسیاری از موارد، عمل تدفین شامل دفن کامل جسد است؛ لذا هنگامی که توسط باستان شناسان مورد کاوش قرار می‌گیرد، یک اسکلت کامل پیدا خواهد شد. در سایر موارد ممکن است دستکاری هایی قبل از دفن روی جسد صورت گرفته باشد. یافته‌های باستان شناسی استخوان‌های سوخته انسانی، نشان می‌دهند که سوزاندن اجساد نیز یکی از روش‌هایی بوده که از ادوار باستانی تا کنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است (۲۳).

فعالیت‌های میکرو ارگانیسم‌های ساکن در خاک

به دلیل ویژگی‌هایی مانند تعداد زیاد کپی‌ها و ثبات نسبی، DNA میتوکندریایی[6] به طور خاص در مطالعات باستان شناسی برای شناسایی روابط خانوادگی و بررسی تنوع‌های ژنتیکی استفاده می‌شود. (۲۴) تعداد زیاد نسخه‌ها در هر سلول، mtDNA به تعداد زیادی وجود دارد (تقریباً ۱۰۰۰ نسخه یا بیشتر)، که این امر به بقا و مطالعه آن کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که mtDNA برای ردیابی خطوط ژنتیکی و مطالعه نیاکان مادری بسیار مفید باشد. (۲۵) به این ترتیب، mtDNA ابزار قدرتمندی برای بررسی روابط تکاملی و شجره نامه‌های ژنتیکی فراهم می‌آورد و به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در مطالعات باستان شناسی و تکاملی کاربرد زیادی دارد. mtDNA در مقایسه با DNA هسته‌ای کمتر دچار آسیب و تخریب در طول زمان می‌شود؛ بنابراین، می‌توان از آن در مطالعات

6- Mitochondrial DNA

[Downloaded from labdiagnosis.ir on 2026-11-12]

باســـتان شناسی بهره برد. به علت فراوان بودن میتوکندری درون سلول‌ها، حتی اگر نمونه‌های زیستی به شدت تخریب شده باشـــند، باز هم mtDNA به اندازه کافی موجود است که بتوان توالی نوکلئوتید آن را به دست آورد. (۲۶)


❑ استخراج DNA از استخوان

اســـتخراج DNA از اســـتخوان‌های باســـتانی یکـــی از فرآیندهای پیچیده و چالش برانگیز در علم ژنتیک اســـت. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، تخریب شدید DNA در طول هزاران سال است که ناشی از عواملی مانند تغییرات دمایی، رطوبت، فعالیت‌های میکروبی و شـــیمی خاک می‌باشـــد. این تخریب به ویژه در اســـتخوان‌ها و دندان‌ها بســـیار قابل توجه اســـت و همین امر استخراج و تحلیل DNA را دشوار می‌ســـازد. (۲۷) اســـتخوان‌ها یکی از منابع اصلی استخراج DNA از بقایای باستانی به شـــمار می‌آیند، زیرا نسبت به دیگـــر بافت ها مانند پوســـت یا عضـــلات، در برابر تخریب محیطی مقاوم‌ترند. استخوان‌ها به دلیل ساختار معدنی خود (کلسیم و فســـفات) معمولاً نسبت به سایر بافت ها بهتر از تخریب‌های محیطی محافظت می‌شـــوند و به همین دلیل استخراج DNA از آن‌ها می‌تواند اطلاعات ژنتیکی بیشتری فراهم کند.

این تحقیقات همچنین به شناســـایی نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با برخـــی بیماری‌ها و اختلالات ژنتیکی کمک کرده اســـت که می‌تواند به ویژه در زمینه‌های پزشـــکی و ژنتیک مفید باشـــد. علاوه بر این، استخراج DNA از استخوان‌های باستانی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره ارتباطات بین گونه‌های مختلف انســـانی مانند نئاندرتال ها و انســـان‌های مدرن فراهم کند و تاریخ تکامل بشر را روشن‌تر کند. (۲۸)

❑ استخراج DNA از دندان

اســـتخراج DNA از دندان، یک ابـــزار قدرتمند در علوم باســـتان شناســـی، پزشـــکی قانونی و ژنتیک اســـت. این تکنیک‌ها به ویژه در مواردی که نمونه‌های بیولوژیکی دیگر قابل دسترس نیستند، کاربرد دارند. دندان و استخوان‌ها به دلیل ســـاختار معدنی خود، می‌توانند مقادیر زیادی DNA را در شـــرایط مناسب حفظ کنند. برای استخراج DNA از دندان، معمولاً پالپ دنـــدان (بافت نرم درون دندان) هدف قرار می‌گیـــرد. پالپ دندان به طور طبیعـــی حاوی مقادیر بالایی از DNA است و با استفاده از تکنیک‌های شیمیایی و آنزیمی، DNA استخراج می‌شود. (۲۹) (تصویر۴)




تصویر۴: استخراج بافت پالپ دندان با دسترسی استاندارد ریشه و ذخیره پالپ (۳۰)

❑ استخراج DNA از مو

اســـتخراج DNA از تارهای مو می‌تواند شواهد مهمی در پزشـــکی قانونی برای شناســـایی افراد باشد و همچنین در باستان شناسی، موهای باستانی معمولاً از مکان‌های حفاری (خاک و مقبره‌ها) یا بقایای انســـانی جمع آوری می‌شـــوند. در حال حاضر برای کارهای جرم شناسی، باستان شناسی، تســـت والدین و مطالعات حیوانات وحشی و اهلی از DNA اســـتخراج شده از مو استفاده می‌شود. در تحقیقات پزشکی قانونی، موی انســـانی که به صورت ریزش یافته است، یکی از رایج‌ترین انواع شـــواهد زیستی محسوب می‌شود. موهای ریزش یافته معمولاً در مرحلـــه تلوژن قرار دارند که حاوی مقدار کمی DNA هسته‌ای هستند. اما در هر سلول تعداد زیادی mtDNA وجود دارد که امکان تحلیل تارهای موی تـــک را فراهم می‌کند. معمـــولاً از روش‌های مختلفی برای اســـتخراج DNA از تارهای مو استفاده می‌کنند. (تصویر۵) این تکنیک‌ها به منظـــور حداکثر کردن بازیابی mtDNA، به ویژه از نمونه‌های تخریب شـــده کـــه در آن‌ها روش‌های اســـتخراج DNA هســـته‌ای ســـنتی ممکن اســـت ناکام بمانند، طراحی شـــده‌اند. به طور کلی، اســـتخراج و تحلیل mtDNA از موی انســـانی ریزش یافتـــه، ابزاری حیاتی در علم پزشکی قانونی و باستان شناسی به شمار می‌آید که به محققان این امـــکان را می‌دهد تا ارتباطات بین مظنونان و صحنه‌های جرم را حتی زمانی که ســـایر اشکال شواهد در دســـترس نیستند، برقرار کنند. پس از استخراج DNA، از تکنیک‌های مختلفی برای تحلیل آن استفاده می‌کنند. یکی

[Downloaded from labdiagnosis.ir on 2026-11-12]

از رایج‌تریـــن روش‌ها، تحلیل mtDNA اســـت که به دلیل وجود تنوع زیاد در توالی‌های آن، امکان شناســـایی افراد را فراهم می‌کنـــد. این تنوع می‌تواند به محققان کمک کند تا ارتباطات خانوادگی و نژادی را بررسی کنند. (۳۱)



تصویر۵: شماتیکی از روش‌های استخراج DNA از نمونه مو (۳۲)

روش‌های اســـتخراج DNA از پارچه‌ها و لباس‌های باستانی

تجزیـــه و تحلیـــل نمونه‌های باســـتانی: اســـتخراج DNA از نمونه‌های باســـتانی نیازمند دقت و تکنیک‌های خاص است. اولین مرحله، تجزیه و تحلیل نمونه‌ها اســـت که شامل شناسایی و جمع آوری بافت های قابل استفاده است. پارچه‌ها و لباس‌های باستانی معمولاً تحت تأثیـــر عواملی مانند رطوبت، دما و مواد شـــیمیایی قرار گرفته‌اند کـــه می‌توانند بر کیفیت DNA تأثیر بگذارند .برای اســـتخراج موفق DNA از این نمونه‌ها، لازم اســـت که پارچه‌های باســـتانی با احتیاط تمیز شوند تا از آلودگی‌های احتمالی محیطی دور نگه داشـــته شـــوند. این فرآیند ممکن است شامل استفاده از ابزارهای غیرآلوده و محیط‌های استریل باشد. همچنین برا این کار، بافت های مناسب از پارچه انتخاب شده و به روش‌های مخصوصی مانند آســـیاب کردن یا خرد کردن تبدیل به پودر می‌شوند. سپس DNA از ایـــن پـــودر با اســـتفاده از روش‌های شـــیمیایی خاص استخراج می‌شود. DNAاستخراج شـــده باید تحت تکنیک‌های پیشـــرفته مانند واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و توالی یابی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شـــود کـــه کیفیت و مقـــدار DNA به اندازه کافی برای تحلیل‌های بعدی مناســـب اســـت. استخراج DNA از پارچه‌های تاریخی به علت قدیمی بودن و گاهی اوقات فرســـایش، با مشـــکلات خاصی مواجه اســـت، مانند آلودگی با مواد خارجی و زیستی و کمبود DNA. (۳۳)

استخراج DNA از خاک

استخراج DNA از خاک می‌تواند به شناسایی هویت انسان‌های باســـتانی و تعیین تبار آن‌ها کمک کند. خاک می‌تواند شامل مواد آلی و غیرآلی باشـــد که DNA انسانی در آن به دلیل فعالیت‌های انســـانی، نظیر دفن یا رهاسازی مواد بیولوژیکی، وجود دارد. با این حال، استخراج DNA از خاک فرسوده به دلیل وجود آلودگی‌های میکروبی و مواد شیمیایی چالش برانگیز است. استخراج DNA از خاک فرسوده چالش‌های زیادی دارد مثل آلودگی میکروبی و تنوع ژنتیکی، خاک حاوی میکروارگانیســـم‌ها و DNA سایر موجودات زنده است که می‌تواند بر نتایج استخراج اثر داشته باشد. همچنین به دلیل رطوبت و برخی شرایط محیطی خاک، احتمال تجزیه DNA موجود در آن وجود دارد. با وجود چالش‌های فراوان در اســـتخراج DNA از خـــاک، این روش کاربردهای زیادی در تحقیقات جنایی و باستان شناســـی دارد. روش‌های مختلفی برای استخراج DNA از خاک فرسوده موجود هست که به سه دسته فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقســـیم می‌شوند. در روش شـــیمیایی، خاک ابتدا با محلول لیز کننده (مانند بافر تریس و EDTA) مخلوط می‌شود تا ســـلول‌ها تخریب و DNA آزاد شود. سپس با استفاده محلول‌های شیمیایی مانند فنول و کلروفرم، DNA از سایر مواد جدا می‌شود. در روش فیزیکی، خاک به طور مکانیکی تجزیه می‌شود تا DNA آزاد شـــود. برای این کار از تکنیک‌های مکانیکی مانند سانتریفیوژ و هموژنیزاســـیون استفاده می‌شود. در روش بیولوژیکی با استفاده از آنزیم‌ها مانند پروتئیناز K برای تجزیه پروتئین‌ها و آزادســـازی DNA پرداخته می‌شود. این آنزیم‌ها می‌توانند به تجزیه بافت‌های سلولی کمک کنند و DNA را از آلودگی‌ها جدا کنند. (۳۴)

نتیجه گیری

در حال حاضر این منصفانه نیســـت که از فناوری زیســـتی در توســـعه میراث فرهنگی استفاده نشـــود، زیرا به کار بردن آن در شـــناخت فرهنگ اقـــوام ایرانی می‌توانـــد جایگاه‌های شاخص موجود در تاریخ ایران را برای ما نمایان سازد. استفاده از ژنتیک در تشـــخیص نمونه‌ها، خطاها و کمبودهایی که در روش مورفومتریک وجـــود دارد را مرتفع می‌کند و در نتیجه، در زمینه روند تکاملی بشر و بررسی زیستگاه و شرایط زندگی در دوره‌های مختلف می‌تواند مفید باشد. همچنین علم ژنتیک

[Downloaded from labdiagnosis.ir on 2026-11-12]

در باســـتان شناســـی می‌تواند در زمینه فرهنگ، عقاید دینی، کشاورزی، آداب و رسوم، مراسم‌های تدفین، بیماری‌ها و غیره استفاده شود. روش‌های مبتنی بر DNA امروزه بهترین روش برای تمایز بین موجودات نزدیک به هم اســـت. (۳۵) در این میان PCR یک روش بسیار حساس و مناسب جهت شناسایی ژنتیکی و ترســـیم گذشـــته و حال و حتی آینده می‌باشد. این روش با اســـتفاده از حتی یک تار مو، قادر به شناسایی پیشینه ژنتیکـــی موجودات می‌باشـــد. اما در این میان مـــاده اولیه و اصلـــی مورد نیاز برای این گروه از مطالعات وجود ژنوم DNA می‌باشـــد تا بتوانیم با بررســـی بخش‌هـــای مختلف آن پی به پیشـــینه ژنتیکی موجودات ببریم. این امـــر می‌تواند به دلیل از میـــان رفتن اکثریت ژنوم موجود زنده بر اثر فرســـایش و یا وجود مهارکننده‌های متعدد واکنش زنجیره‌ای پلیمراز باشـــد لذا پروتکل بهینه اســـتخراج ژنومی از اهمیت بالایی برخوردار اســـت تا بتوان بـــه طبع آن ابعاد مختلف ژنومـــی نمونه مورد مطالعه را بررسی نمود. (۳۶)

References:

1- Thompson M. Scientific Advances in Forensic Archeology and Anthropology: A Review. Arch &Anthropol Open Acc. 2023;5(1):718-21.
2- Pileh A, Ghazvini SA, Razei A. Role of DNA In Confirm of Lineage. Journal of Family Research. 2014;9(3):381-97.
3- Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharf SJ, Higuchi R, Horn GT, et al. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science. 1988;239(4839):487-91.
4- Noonan JP, Coop G, Kudaravalli S, Smith D, Krause J, Alessi J, et al. Sequencing and analysis of Neanderthal genomic DNA. science. 2006;314(5802):1113-8.
5- Green RE, Krause J, Ptak SE, Briggs AW, Ronan MT, Simons JF, et al. Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA. Nature. 2006;444(7117):330-6.
6- Geigl EM. On the circumstances surrounding the preservation and analysis of very old DNA. Archaeometry. 2002;44(3):337-42.
7- JS M. Genome sequencing in microfabricated high-density picolitre reactors. Nature. 2005;437(7057):376380.
8- Poinar HN, Schwarz C, Qi J, Shapiro B, MacPhee RD, Buigues B, et al. Metagenomics to paleogenomics: large-scale sequencing of mammoth DNA. science. 2006;311(5759):392-4.
9- Rogaev EI, Moliaka YK, Malyarchuk BA, Kondrashov FA, Derenko MV, Chumakov I, et al. Complete mitochondrial genome and phylogeny of Pleistocene mammoth Mammuthus primigenius. PLoS Biology. 2006;4(3):e73.
10- Höss M, Dilling A, Currant A, Pääbo S. Molecular phylogeny of the extinct ground sloth Mylodon darwinii. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1996;93(1):181-5.
11- Pääbo S. Ancient DNA: extraction, characterization, molecular cloning, and enzymatic amplification. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1989;86(6):1939-43.
12- Thomas RH, Schaffner W, Wilson AC, Pääbo S. DNA phylogeny of the extinct marsupial wolf. Nature. 1989;340(6233):465-7.
13- https://www.genome.gov/genetics-glossary/DNA-Fingerprinting
14- Pollard AM, Armitage RA, Makarewicz CA. Handbook of archaeological sciences: John Wiley & Sons; 2023.
15- Drohojowska J, Szwedo J, Müller P, Burckhardt D. New fossil from mid-Cretaceous Burmese amber confirms monophyly of Liadopsyllidae (Hemiptera: Psylloidea). Scientific Reports. 2020;10(1):17607.
16- Khezai A, Khazaei A, Qasempouri SK, Seyed-Shojaii M. Optimization of DNA extraction from museum and ancient animal samples including skin and bone of mammals using modified phenol-chloroform method (Case study: Caspian seal). Arid Environ Journal. 2020;14(1):1-9. doi: 10.22034/AEJ.2020.122652
17- Mata R, Merheb MM. Paleogeneticist view of leather: The role of mitochondrial DNA to uncover the mysteries of fake leather and its products. Biochem Biophys Res Commun. 2016;9:6-1
18- Noonan JP, Hofreiter M, Smith D, Priest JR, Rohland N, Rabeder G, Krause J, Detter JC, Paabo S, Rubin EM. Genomic sequencing of Pleistocene cave bears. Science. 2005 Jul 22;309(5734):597-9.
19- Morozova I, Flegontov P, Mikheyev AS, et al. Toward high-resolution population genomics using archaeological samples. DNA Res. 2016; 23:295-310
20- Berens AJ, Cooper TL, Lachance J. The genomic health of ancient hominins. Hum Biol. 2017; 89:7 19
21- Marta Z, Mario C, Barbara B, Paolo V, Maria S, Maria C. Mitochondrial D-loop sequence variation among Italian horse breeds. 2004.
22- Fulton TL, Shapiro B. Setting up an ancient DNA laboratory. Ancient DNA: methods and protocols. 2019:1-13.
23- Krause J. From genes to genomes: what is new in ancient DNA? Mitteilungen der Gesellschaft für urgeschichte. 2010;19:11-34.
24- Newmaster SG, Grguric M, Shanmughanandhan D, Ramalingam S, Ragupathy S. DNA barcoding detects contamination and substitution in North American herbal products. BMC medicine. 2013;11:1-13.
25- Ghovvati S, Nassiri M, Mirhoseini S, Moussavi AH, Javadmanesh A. Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay. Food control. 2009;20(8):696-9.
26- Hodgson JA, Disotell TR. Anthropological genetics: Inferring the history of our species through the analysis of DNA. Evolution: Education and Outreach. 2010;3:387-98.
27- Pääbo S, et al. The challenges of ancient DNA extraction and analysis. Trends in Genetics. 2017;33(12):801-808.
28- Gamba C, et al. The state of ancient DNA research and the challenges in current ancient DNA sequencing and analysis. Trends in Genetics. 2020;36(8):689-701.
29- Slatkin M, Racimo F. Ancient DNA and human history: a review. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016;113(23):6767-6773
30- Green RE, Krause J, Briggs AW, Maricic T, Stenzel U, Kircher M, et al. A draft sequence of the Neandertal genome. science. 2010;328(5979):710-22.
31- Asamura H, Ota M, Takayanagi K, Saito S, Tsukada K, Fukushima H. Molecular genetic analysis of the Am phenotype of the ABO blood group system. Vox sanguinis. 2002;83(3):263-7.
32- Willerslev E, Cooper A. Ancient dna. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2005;272(1558):3-16.
33- https://www.ishinews.com/no-nuclear-dna-in-rootless-hair-myth-or-fact/
34- Kholief M, El Shanawany S, Gomaa R. Sex determination from dental pulp DNA among Egyptians. Egyptian Journal of Forensic Sciences. 2017 Dec;7:1-7.
35- Orlando L, Allaby R, Skoglund P, Der Sarkissian C, Stockhammer PW, Ávila-Arcos MC, et al. Ancient DNA analysis. Nature reviews methods primers. 2021;1(1):14.
36- Schmerer WM. Extraction of Human DNA from Soil: Protocol Adaptations. arXiv preprint arXiv:240512422. 2024.

[Downloaded from labdiagnosis.ir on 2026-11-12]