

نشانه‌های زیستی بزاقی در تشخیص بیماری‌های متابولیک

● مهرداد جمادی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی،
گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی،
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی



زنجان، زنجان، ایران

● دکتر حبیب ضیغمی

استاد علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران



zeighami@zums.ac.ir

● شبلم پور خاتونی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، گروه
میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران



● فاطمه قاسمی منش

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی،
گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی،
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی



زنجان، زنجان، ایران

□ چکیده

شناسایی نشانه‌های زیستی مرتبط با چاقی، دیابت، دیس‌لیپیدمی و بیماری کبد چرب غیر الکلی مطرح شده است. اندازه‌گیری بیومارکرهایی مانند انسولین، لپتین، آدیپونکتین، گرلین و $TNF-\alpha$ بزاقی، همبستگی بالایی با مقادیر سرمی آن‌ها نشان داده و توانایی تشخیص زود هنگام مقاومت به انسولین و التهاب مزمن را دارد. همچنین، miRNA های بزاقی به دلیل نقش تنظیمی‌شان در مسیرهای متابولیکی، در تمایز فنوتیپ های مختلف چاقی اهمیت یافته‌اند. در بیماران دیابتی، غلظت گلوکز، فروکتوز آمین و ۱،۵-انهدروگلوکوسیتول بزاقی، شاخص‌های معتبری برای کنترل قند خون به شمار می‌روند. به‌طور کلی، بزاق شناسی با بهره‌گیری از فناوری‌های مولکولی نوین، افق جدیدی در تشخیص، پیش و پیش بینی بیماری‌های متابولیک فراهم کرده و می‌تواند پایه‌ای برای توسعه روش‌های غیرتهاجمی، دقیق و مقرون به صرفه در پزشکی آینده باشد.

بزاق به عنوان یک مایع زیستی پیچیده و در دسترس، حاوی مجموعه‌ای از ترکیبات بیوشیمیایی، هورمونی و ایمنی است که مشابه پلاسمای خون می‌باشند و از این رو می‌تواند به عنوان جایگزینی غیر تهاجمی برای نمونه‌های خونی در تشخیص بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه مروری روایی^۱ با جست و جو در پایگاه‌های داده مانند PubMed، Google Scholar، Scopus و ScienceDirect، ۷۹ مقاله از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به کلید واژه‌ها، ۶۶ مقاله از میان آن‌ها انتخاب شد. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که ترکیبات بزاقی، از جمله پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، آنتی بادی‌ها، هورمون‌ها، متابولیت‌ها و RNA های کوچک، قادرند تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدن را منعکس کنند. در حوزه بیماری‌های متابولیک، بزاق به عنوان منبعی ارزشمند برای

1- Narrative review



کلمات کلیدی: تشخیص آزمایشگاهی، نشانگر زیستی، بزاق، بیماری‌های متابولیک

مقدمه

بزاق

بزاق مایعی است که توسط غدد بزاقی به درون حفره دهان ترشح می‌شود و با حفظ رطوبت و سلامت دهان، همچنین تسهیل فرآیند گوارش از طریق نرم کردن غذا و انجام واکنش‌های آنزیمی، نقش حیاتی ایفا می‌کند. ترکیبات بیوشیمیایی مختلفی در بزاق وجود دارند که مشابه ترکیبات موجود در پلاسما هستند. حدود ۹۹٪ از بزاق از آب تشکیل شده است. الکترولیت‌هایی مانند سدیم (Na^+)، پتاسیم (K^+)، کلسیم (Ca^{2+})، منیزیم (Mg^{2+})، بیکربنات (HCO_3^-) و کلرید (Cl^-) با خاصیت بافری خود، pH بزاق را در محدوده ۶/۲ تا ۷/۶ حفظ می‌کنند؛ بیکربنات به ویژه در پیشگیری از فرسایش دندان از طریق خنثی سازی اسیدها نقش دارد. بزاق همچنین حاوی آنزیم‌ها و پروتئین‌هایی نظیر آمیلاز^۲، لیپاز زبانی^۴، موسین^۵، لیزوزیم^۶، لاکتوفرین^۷، پراکسیدازها^۸ و هیستاتین‌ها^۹ است. ایمونوگلوبولین‌ها^{۱۰} نیز بخشی از ترکیبات بزاق هستند. آنتی بادی اصلی بزاق، IgA ترشحی^{۱۱} است که از بدن در برابر عوامل بیماری‌زا محافظت می‌کند. IgG نیز در پاسخ‌های ایمنی به عفونت‌های دهانی نقش دارد. علاوه بر این، هورمون‌ها و فاکتورهای رشد مانند فاکتور رشد اپیدرمی^{۱۲} (EGF)، فاکتور رشد عصبی

^{۱۳} (NGF) و کورتیزول نیز ممکن است در این مایع وجود داشته باشند. پیش سازهای نیتریک اکسید موجود در بزاق نیز با هموستاز عروقی و دفاع ضد میکروبی ارتباط دارند (۵-۱). علاوه بر این‌ها، بزاق ممکن است حاوی متابولیت‌ها و نشانگرهای زیستی تشخیصی مانند گلوکز، اوره، اسیدهای آمینه و فاکتور روماتوئید (RF) باشد. بین این ترکیبات نوعی تعادل وجود دارد که در بیماری‌ها ممکن است دچار اختلال شود؛ از این رو می‌توان از بررسی این عناصر در بزاق، همانند سرم بیماران، برای تشخیص بیماری‌ها استفاده کرد. مزیت اصلی در اینجا، غیرتهاجمی بودن جمع‌آوری بزاق و در دسترس بودن آن است؛ زیرا یک فرد بالغ به طور معمول روزانه بین ۰/۵ تا ۱/۵ لیتر بزاق تولید می‌کند (۵).

بزاق شناسی^{۱۴}، علمی است که به مطالعه ترکیبات بزاق و عملکرد آن‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌پردازد. به دلیل ارتباط نزدیک بین خون و بزاق از طریق دستگاه گردش خون، ترکیبات مشابهی در هر دو مایع زیستی یافت می‌شوند، اگر چه در غلظت‌های متفاوت (۶). از این رو، پژوهشگران در تلاش‌اند از بزاق به عنوان جایگزینی غیرتهاجمی برای نمونه‌گیری خون در تشخیص بیماری‌ها استفاده کنند. ترکیبات موجود در بزاق که می‌توانند در روش‌های تشخیصی مفید باشند، به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند، DNA، RNA (mRNA، miRNA) نشانگرهای زیستی مبتنی بر متابولیت‌ها و میکروبیوم‌ها. شایان ذکر است که بزاق نه تنها برای آزمایش‌های معمولی کاربرد دارد، بلکه

- 2- Saliva
- 3- Amylase
- 4- Lingual Lipase
- 5- Mucin
- 6- Lysozyme
- 7- Lactoferrin
- 8- Peroxidases
- 9- Histatins
- 10- Immunoglobulin (Ig)
- 11- Secretory IgA (SIgA)
- 12- Epidermal Growth Factor
- 13- Nerve Growth Factor
- 14- Salivaomics

می‌تواند در تشخیص زود هنگام برخی سرطان‌ها، مانند کارسینوم سلول سنگفرشی دهان^{۱۵} (OSCC)، نیز بسیار مؤثر باشد (۷،۸). امروزه کیت‌هایی مانند Oragene برای جمع آوری بزاق در دسترس هستند. نکته مهم در فرآیند جمع آوری بزاق، حفظ پایداری نشانگرهای زیستی در نمونه است. برای دستیابی به این هدف، باید بازدارنده‌های نوکلئاز، پروتئاز و لیپاز به بزاق افزوده شوند تا از تخریب نشانگرهای زیستی در نمونه جلوگیری شود (۹).

□ بیماری‌های متابولیک

بیماری‌های متابولیک^{۱۶} گروهی از بیماری‌ها هستند که با اختلال در مسیرهای بیوشیمیایی حیاتی برای حفظ هموستاز بدن مشخص می‌شوند. این اختلالات ممکن است ناشی از بی‌نظمی هورمونی، نقص آنزیمی یا مشکلات در فرآیندهای سلولی باشند که متابولیسم پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، لیپیدها یا سایر مولکول‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بیماری‌های متابولیک می‌توانند اکتسابی باشند (در اثر عوامل محیطی و سبک زندگی) یا ارثی (به صورت ژنتیکی منتقل شوند). از بیماری‌های متابولیک اکتسابی می‌توان به دیابت نوع دوم، چاقی، دیس لیپیدمی، بیماری کبد چرب غیر الکلی و نقرس اشاره کرد؛ در حالی که فنیل کتونوریا، بیماری ادرار شربتی، بیماری گوچر و اختلالات میتوکندریایی از جمله بیماری‌های متابولیک ارثی هستند (۱۰،۱۱).

□ چاقی و بزاق

چاقی^{۱۷}، به عنوان یک بیماری مزمن، پیچیده و چند

عاملی متابولیک شناخته می‌شود که در تعریف علمی با انباشت بیش از حد چربی بدن^{۱۸} مشخص می‌شود که این تجمع غیر طبیعی یا بیش از حد چربی به سلامتی آسیب می‌رساند و خطر ابتلا به مجموعه گسترده‌ای از بیماری‌های جدی مانند دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی-عروقی^{۱۹} (CVD)، فشار خون بالا^{۲۰} و کبد چرب غیر الکلی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این وضعیت پاتوفیزیولوژیک از طریق برهم‌کنش پیچیده عوامل ژنتیکی، رفتاری، محیطی و متابولیکی ایجاد می‌شود (۱۲).

در حال حاضر، تشخیص و ارزیابی بالینی چاقی به طور عمده بر استفاده از نشانگرهای مختلفی انجام می‌گیرد که شناخته شده‌ترین آن‌ها، شاخص توده بدنی^{۲۱} (BMI) است. شاخص توده بدنی از تقسیم وزن فرد (بر حسب کیلوگرم) بر مجذور قد (بر حسب متر مربع) محاسبه می‌شود و طبق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO)، شاخص توده بدنی برابر یا بالاتر از ۳۰ به عنوان چاقی تعریف می‌گردد؛ با این حال، محدودیت اصلی این شاخص عدم توانایی آن در تمایز بین توده عضلانی و توده چربی است (۱۳،۱۴).

برای ارزیابی دقیق‌تر و تعیین خطر متابولیک، از اندازه‌گیری دور کمر نیز استفاده می‌شود، زیرا چربی ذخیره شده در ناحیه شکمی (چربی احشایی) ارتباط قوی‌تری با خطرات سلامتی دارد (۱۵). فراتر از اندازه‌گیری‌های فیزیکی، تست‌های آزمایشگاهی خون نیز برای ارزیابی عوارض همراه و تعیین ریسک سندرم متابولیک انجام می‌شود که شامل اندازه‌گیری پارامترهایی مانند قند خون ناشتا (FBS)، پروفایل لیپیدی^{۲۲} (کلسترول، تری‌گلیسرید)،

- 15- Oral squamous cell carcinoma
- 16- Metabolic Diseases
- 17- Obesity
- 18- Adiposity
- 19- Cardiovascular diseases
- 20- Hypertension
- 21- Body Mass Index
- 22- Lipid Profile Test



هایپرانسولینمی را منعکس کند؛ این اندازه گیری به طور قابل ملاحظه‌ای با شاخص‌های دقیق سرمی (مانند HOMA-IR)^{۲۹} همبستگی مثبت دارد. اهمیت اصلی این بیومارکر در توانایی آن برای تشخیص زود هنگام اختلالات متابولیک نهفته است، به طوری که افزایش سطح آن در بزاق می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را مدت‌ها قبل از رسیدن شاخص توده بدنی (BMI) به آستانه چاقی یا ظهور علائم بالینی آشکار پیش بینی کند، در نتیجه آن را به ابزاری قدرتمند برای غربالگری‌های مکرر و غیرتهاجمی تبدیل می‌کند (۱۹).

لپتین بزاقی، آدیپوکلین^{۳۰} اصلی است که مستقیماً از سلول‌های چربی (آدیپوسیت‌ها) ترشح می‌شود و به دلیل ارتباط قوی و مستقیم آن با حجم کل توده چربی بدن، به عنوان یک نشانگر مهم در تشخیص و پایش چاقی مورد توجه قرار گرفته است. نقش فیزیولوژیک لپتین در حالت طبیعی، انتقال پیام سیری به هیپوتالاموس و تنظیم تعادل بلند مدت انرژی و وزن بدن است (۲۰). در افراد چاق، به دلیل افزایش چشمگیر توده چربی، غلظت لپتین به صورت معنی داری افزایش می‌یابد؛ با این حال، افزایش بیش از حد آن منجر به ایجاد پدیده‌ای به نام مقاومت به لپتین می‌شود، به این معنی که با وجود سطوح بالای سیگنال سیری، مغز توانایی پاسخ به آن را از دست می‌دهد و فرد همچنان پرخوری می‌کند. غلظت لپتین بزاقی دارای همبستگی مثبت قوی و قابل اعتمادی با غلظت لپتین سرم و همچنین با شاخص‌های چاقی نظیر شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن^{۳۱} (BFP) است. این همبستگی، لپتین بزاقی را به یک ابزار اختصاصی برای تخمین میزان توده چربی بدل می‌سازد (۲۱). از نظر تشخیصی، اندازه‌گیری لپتین بزاقی با حساسیت بالایی می‌تواند افراد را بر اساس حجم بافت چربی

HbA1c و در برخی موارد هورمون‌هایی نظیر لپتین^{۳۲} و آدیپونکتین^{۳۳} و همچنین نشانگرهای التهابی مانند CRP^{۳۴} است تا نمای کاملی از وضعیت متابولیکی بیمار فراهم شود. این روش‌های تشخیصی، اگر چه استاندارد هستند، اما اغلب به دلیل تهاجمی بودن (مانند خون‌گیری) یا دقت ناکافی در ارزیابی ترکیب واقعی بدن (مانند BMI)، نیاز به روش‌های جایگزین و غیرتهاجمی را برجسته می‌سازند. بزاق به عنوان یک مایع حاوی مقادیر قابل اندازه‌گیری از مولکول‌هایی که در گردش خون و فرآیندهای متابولیک سیستمیک نقش دارند، می‌تواند تغییرات بیوشیمیایی ناشی از چاقی را منعکس کند (۱۶).

انسولین بزاقی به عنوان یک نشانگر غیر تهاجمی و بسیار مهم در ارزیابی خطر متابولیک مرتبط با چاقی شناخته می‌شود (۱۷). این هورمون پپتیدی، که نقشی حیاتی در تنظیم هموستاز گلوکز ایفا می‌کند، در افراد چاق به ویژه افرادی که با افزایش توده چربی احشایی مواجه هستند، به دلیل بروز مقاومت به انسولین^{۳۵}، در سطوح بالاتری در خون و به تبع آن در بزاق مشاهده می‌شود. مکانیسم اثر گذاری چاقی بر انسولین بدین صورت است که به دلیل تجمع لیپیدها در بافت‌های غیر چربی (مانند کبد و عضلات) و ترشح سایتوکین‌های پیش‌التهابی از آدیپوسیت‌های هایپرتروفی شده، مسیرهای پیام‌رسانی انسولین مختل می‌شوند. برای غلبه بر این مقاومت، سلول‌های بتای پانکراس ناچار به ترشح بیش از حد انسولین می‌شوند که وضعیت هایپرانسولینمی^{۳۶} را ایجاد می‌کند (۱۸). مطالعات بالینی نشان داده‌اند که اندازه‌گیری انسولین بزاقی، به ویژه پس از چالش‌های گلوکزی (مانند OGTT^{۳۷})، می‌تواند با دقت و حساسیت بالایی (که در برخی مطالعات تا ۸۰٪ نیز گزارش شده است) وضعیت مقاومت به انسولین و

- 23- Leptin
- 24- Adiponectin
- 25- C-reactive protein
- 26- Insulin resistance
- 27- Hyperinsulinemia
- 28- Oral Glucose Tolerance Test
- 29- Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance
- 30- Adipokine
- 31- Body Fat Percentage



طبقه بندی کند و به ویژه در مطالعات اطفال و نوجوانان، که مداخلات اولیه بسیار حائز اهمیت است، کاربرد بالایی دارد. جمع آوری نمونه بزاق برای اندازه‌گیری لپتین، یک روش ساده و غیرتهاجمی را برای پایش اثربخشی برنامه‌های کاهش وزن، که باید منجر به کاهش همزمان سطح لپتین شود، فراهم می‌آورد (۲۲).

آدیپونکتین بزاقی، برخلاف لپتین، یک آدیپوکین با خواص مفید و محافظتی است که نقش کلیدی در افزایش حساسیت به انسولین، کاهش التهاب عروقی و ترویج اکسیداسیون اسیدهای چرب ایفا می‌کند. این هورمون عملکرد خود را از طریق تأثیر بر کبد و بافت‌های عضلانی اعمال کرده و به جلوگیری از تجمع چربی در اندام‌های حیاتی و کاهش خروجی گلوکز از کبد کمک می‌کند (۲۱). با کمال تعجب، در افراد چاق و مبتلایان به سندرم متابولیک، سطح آدیپونکتین به طور مشخصی کاهش می‌یابد. این کاهش شدید، نشان دهنده اختلال عملکرد متابولیک بافت چربی^{۳۲} است که زمینه ساز اصلی مقاومت به انسولین و التهاب مزمن درجه پایین در چاقی است. غلظت آدیپونکتین بزاقی یک همبستگی منفی معنی دار با شاخص‌های چاقی و مقاومت به انسولین نشان می‌دهد، که آن را به یک نشانگر اختصاصی برای تمایز افراد چاق با وضعیت متابولیک سالم از افراد چاق با خطر بالای عوارض تبدیل می‌کند. کاهش آدیپونکتین بزاقی می‌تواند به عنوان یک هشدار زود هنگام برای پیشرفت به سمت دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی-عروقی عمل کند. بنابراین، آدیپونکتین بزاقی نه تنها وضعیت توده چربی را منعکس می‌کند، بلکه مهم‌تر از آن، کیفیت متابولیک بافت چربی و ریسک اختلالات سیستمیک را نیز ارزیابی می‌نماید و می‌تواند به عنوان یک نشانگر مستقل یا در ترکیب با سایر بیومارکرها (مانند انسولین و لپتین) برای افزایش دقت تشخیصی در

مدیریت چاقی مورد استفاده قرار گیرد (۲۳).
MicroRNAs (miRNAs) بزاقی مولکول‌های کوچک RNA غیر کد کننده‌ای^{۳۳} هستند که به دلیل نقش حیاتی‌شان در تنظیم بیان ژن در فرآیندهای سلولی مختلف، از جمله متابولیسم انرژی و تمایز آدیپوسیت‌ها، در تشخیص چاقی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند. این مولکول‌ها می‌توانند از سلول‌های چربی، کبد یا سایر بافت‌های مرتبط با اختلالات متابولیک به بزاق منتقل شوند (۲۴). تغییر در الگوی بیانی برخی از miRNAها (مانند خانواده‌های مرتبط با مسیر پیام رسانی انسولین یا التهاب) در بزاق افراد چاق گزارش شده است. مکانیسم اثر گذاری آن‌ها از طریق تعدیل پسارونویسی ژن‌های هدف صورت می‌گیرد که در نتیجه منجر به تغییر در حساسیت به انسولین، لیپولیز (تجزیه چربی) یا آدیپوژنز (تشکیل سلول‌های چربی) می‌شود. پتانسیل تشخیصی miRNAهای بزاقی در اختصاصیت بالقوه بالای آن‌ها برای شناسایی فنوتیپ‌های فرعی^{۳۴} چاقی (مانند چاقی ژنتیکی یا التهابی) نهفته است (۲۵). در حال حاضر، مطالعات بر روی miRNAها در بزاق بیشتر ماهیت تحقیقاتی دارند و به دنبال کشف پروفایل‌های ترکیبی از miRNAها برای دستیابی به دقت تشخیصی بسیار بالا هستند، به طوری که بتوانند خطر چاقی را در سطحی اپی ژنتیکی پیش‌بینی کنند؛ این امر به خصوص در غربالگری کودکان در معرض خطر، قبل از بروز تغییرات بالینی مشهود، می‌تواند انقلاب آفرین باشد. به طور خاص، افزایش بیان miRNAهایی نظیر miR-222، miR-122، miR-143، و miR-1246 در بزاق و وزیکول‌های مشتق از آن، به صورت معنا داری با شاخص‌های چاقی و پارامترهای متابولیک نامطلوب مانند سطح گلوکز و چربی خون همبستگی دارد. این miRNAها، که در پاتوفیزیولوژی چاقی نقش دارند (مانند

32- Adipose Tissue Dysfunction

33- Non-coding RNA

34- Sub-phenotypes



ویژه چربی احشایی) به عنوان یک اندام اندوکراین فعال عمل می‌کند و مقادیر زیادی از سایتوکین های التهابی مانند $TNF-\alpha$ و IL-6 را ترشح می‌کند. این وضعیت التهاب مزمن درجه پایین عامل اصلی مقاومت به انسولین و سایر عوارض متابولیک مرتبط با چاقی است. غلظت $TNF-\alpha$ بزاقی با غلظت آن در خون و شاخص های التهابی سیستمیک همبستگی مثبت دارد. اندازه گیری $TNF-\alpha$ در بزاق روشی غیر تهاجمی برای ارزیابی و پایش شدت التهاب سیستمیک مرتبط با چاقی است. افزایش سطح آن در بزاق می‌تواند به عنوان یک شاخص ریسک برای پیشرفت به سمت سندرم متابولیک، دیابت نوع ۲ و بیماری های قلبی-عروقی عمل کند. این بیومارکر به ویژه در مطالعاتی که اثربخشی مداخلات کاهش وزن (مانند رژیم غذایی یا ورزش) بر کاهش التهاب را می‌سنجند، مورد استفاده قرار می‌گیرد (۱۶،۳۰).

□ دیابت و بزاق

یکی از شایع ترین بیماری ها در سراسر جهان، دیابت ملیتوس^{۴۱} (DM) است که تأثیر زیادی بر امید به زندگی بیماران دارد. در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۳۷ میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت گزارش شدند و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۶۴۳ میلیون نفر برسد. دیابت به دو نوع تقسیم می‌شود، نوع I که در آن سلول های ترشح کننده انسولین در پانکراس دچار کمبود هستند و نوع II که در آن گیرنده های انسولین کارایی کافی ندارند (۳۱). در هر دو حالت، هایپرگلیسمی (افزایش قند خون) رخ می‌دهد که منجر به بروز علائم دیابت مانند قند در ادرار^{۴۲} (گلیکوزوری)، پر ادراری^{۴۳} (پلی یوریا) و تشنگی مفرط^{۴۴} (پلی دیپسیا)

تنظیم آدیپوژنز توسط miR-143 و تأثیر بر متابولیسم کبدی توسط miR-122، از طریق بزاق به عنوان یک بیوپسی مایع^{۳۵} قابل اندازه گیری هستند و پتانسیل بالایی برای استفاده به عنوان نشانگرهای تشخیصی اختصاصی در چاقی کودکان و بزرگسالان را ارائه می‌دهند (۲۶،۲۷).

گرلین^{۳۶} که اغلب به عنوان هورمون گرسنگی شناخته می‌شود، یک هورمون پپتیدی است که عمدتاً توسط سلول های معده تولید می‌شود. نقش اصلی آن تحریک اشتها، افزایش مصرف غذا و ذخیره چربی است. برخلاف لپتین (هورمون سیری) که سطح آن در چاقی افزایش می‌یابد، سطح گرلین معمولاً قبل از غذا افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد. در افراد مبتلا به چاقی، الگوهای ترشح گرلین اغلب دچار اختلال می‌شود. اگر چه سطح گرلین پلازما در برخی مطالعات چاقی کاهش یافته است، اما اندازه گیری گرلین بزاقی به دلیل ارتباط آن با محور مغز-روده^{۳۷} و نقش آن در فاز سفالیک^{۳۸} پاسخ به غذا (شروع ترشح آنزیم ها و هورمون ها قبل از مصرف غذا) اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش ها نشان داده اند که گرلین بزاقی، به ویژه فرم فعال آن آسیل گرلین^{۳۹}، می‌تواند به عنوان یک شاخص غیر تهاجمی برای ارزیابی اختلالات مربوط به تنظیم اشتها و سیری عمل کند. تغییر در سطح گرلین بزاقی نه تنها وضعیت تغذیه ای را منعکس می‌کند، بلکه در پایش پاسخ به درمان های کاهش وزن (مانند جراحی باریاتریک) نیز مفید است، زیرا این درمان ها اغلب با تغییرات چشمگیر در ترشح گرلین بزاقی همراه هستند (۲۸،۲۹).

فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا^{۴۰} یک سایتوکین پیش التهابی مهم است که نقش محوری در پاسخ های التهابی و ایمنی دارد. در چاقی، بافت چربی هایپرتروفی شده (به

- 35- Liquid Biopsy
- 36- Ghrelin
- 37- Gut-Brain Axis
- 38- Cephalic Phase
- 39- Acyl-Ghrelin
- 40- Tumor Necrosis Factor Alpha
- 41- Diabetes mellitus
- 42- Glucosuria
- 43- Polyuria
- 44- Polydipsia

بنابراین، نیاز به تعیین دقیق محدوده مرجع گلوکز بزاق برای کاربردهای بالینی وجود دارد (۳۹).

□ فروکتوز آمین

فروکتوز آمین^{۴۸} یک پروتئین غیر آنزیمی گلیکوزیله است که از اتصال گلوکز خون به پروتئین‌های سرمی، عمدتاً آلبومین، تشکیل می‌شود و میانگین قند خون طی ۲ تا ۳ هفته گذشته (به دلیل طول عمر آلبومین) را نشان می‌دهد (۴۰). مطالعات نشان داده‌اند بین فروکتوز آمین سرمی و بزاقی رابطه مستقیمی وجود دارد و هر دو در بیماران دیابتی افزایش می‌یابند. در بیمارانی که مبتلا به اختلالات خونی مربوط به گلبول‌های قرمز هستند، فروکتوز آمین می‌تواند جایگزین مناسبی برای HbA1C باشد، زیرا تغییر در چرخه عمر RBCها باعث افزایش یا کاهش کاذب HbA1C می‌شود. HbA1C همچنین ممکن است تحت تأثیر شرایطی مانند بارداری، بیماری مزمن کلیه^{۴۹} (CKD) یا نارسایی کلیوی انتهایی^{۵۰} (ESRD) قرار گیرد. در چنین مواردی، استفاده از فروکتوز آمین بزاقی یا سرمی برای تعیین شاخص قند خون مفید است (۴۰، ۴۱). مطالعه‌ای توسط R. Ambili و همکاران (۲۰۲۴)، مقدار $68 \mu\text{g/mL}$ را به عنوان کات آف تشخیصی فروکتوز آمین برای دیابت با 95% حساسیت و $81/67\%$ اختصاصیت گزارش کرده است. با این حال، شرایطی مانند بیماری‌های کبدی، سندرم نفروتیک و اختلالات تیروئید می‌توانند با تغییر سنتر پروتئین‌های سرمی، دقت سنجش فروکتوز آمین بزاقی را کاهش دهند. مصرف ویتامین C (اسید آسکوربیک) نیز می‌تواند در آزمون فروکتوز آمین تداخل ایجاد کند، بنابراین توصیه می‌شود بیماران حداقل ۲۴ ساعت پیش از آزمایش از مصرف مکمل

می‌شود. دیابت می‌تواند تهدید کننده حیات باشد، زیرا بدن قادر به استفاده از گلوکز به عنوان منبع اصلی انرژی نیست و ممکن است موجب کتواسیدوز گردد. از سوی دیگر، بیماران دیابتی به علت ضعف سیستم ایمنی، مستعد ابتلا به عفونت‌ها هستند. بنابراین، تشخیص زود هنگام دیابت اهمیت زیادی دارد (۳۱، ۳۲).

برای تشخیص دیابت از روش‌های آزمایشگاهی موجود مانند تست قند خون ناشتا^{۴۵} (FPG/FBS)، آزمایش تحمل گلوکز خوراکی (OGTT)، آزمایش تصادفی قند خون^{۴۶} (RPG) استفاده می‌شود. اما استاندارد طلایی^{۴۷} تشخیص دیابت، آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) است که میانگین قند خون طی ۲ تا ۳ ماه گذشته را با اندازه گیری درصد هموگلوبین متصل به گلوکز در گلبول‌های قرمز نشان می‌دهد. با این حال، همه این آزمایش‌ها نیاز به خون گیری دارند که روشی تهاجمی است (۳۳-۳۵). آزمایش‌های بزاقی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای تست‌های خونی باشند، زیرا غیرتهاجمی، کم هزینه و قابل انجام در هر مکانی هستند و نمونه گیری از بزاق در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود (۳۶).

سطح گلوکز بزاقی بعد از ۱۰ تا ۱۴ ساعت ناشتایی، مشابه خون، در حالت پایدار قرار دارد. سطح گلوکز بزاقی در افراد غیر دیابتی با بیماران دیابتی تفاوت دارد. طبق مطالعات، محدوده طبیعی گلوکز بزاق بین $0/5$ تا $1/0$ میلی گرم در دسی لیتر است و مقادیر بیش از $2/0$ میلی گرم در دسی لیتر نشانگر وضعیت دیابتی می‌باشد (۳۷، ۳۸). در مطالعه‌ای توسط Pérez-Ros و همکاران، غلظت گلوکز بزاقی بیماران دیابتی بین $1/26$ تا 11 میلی گرم در دسی لیتر گزارش شد.

- 45- Fast Blood Sugar / Fast Plasma Glucose
- 46- Random Plasma Glucose
- 47- Gold standard
- 48- Fructosamine
- 49- Chronic Kidney Disease
- 50- End-Stage Renal Disease



ویتامین C خودداری کنند (۴۲). همچنین، ایمونوگلوبولین‌ها (به ویژه IgA) می‌توانند به گلوکز و فروکتوز آمین متصل شوند و در بیماری‌هایی مانند سلیاک یا بیماری برگر (IgA nephropathy)، که سطح IgA غیرطبیعی است، باعث کاهش دقت آزمون فروکتوز آمین شوند (۴۳).

□ ۱،۵-انهدیدروگلوکسیتول (1,5-AG)

آزمایش بزاقی ۱،۵-انهدیدروگلوکسیتول (1,5-AG) یکی دیگر از نشانگرهای مؤثر در تشخیص دیابت است. 1,5-AG آنالوگ گلوکز (۱-دئوکسی گلوکز) و یک پلی آل طبیعی است که در منابع غذایی وجود دارد. در حالت عادی سطح آن در بدن پایدار است، اما در شرایط هایپرگلیسمی (قند خون بالای 180 mg/dl، باز جذب گلوکز در نفرون افزایش یافته و مانع از باز جذب 1,5-AG از طریق همان ناقل‌های مشترک می‌شود. در نتیجه، میزان 1,5-AG در سرم و سپس بزاق کاهش می‌یابد (۴۴). 1,5-AG شاخص کنترل کوتاه مدت قند خون (۱ تا ۲ هفته اخیر) است و می‌تواند افزایش ناگهانی قند خون (به ویژه بعد از غذا) را نشان دهد. کاهش سطح-1,5-AG تنها ۱ تا ۲ روز پس از هایپرگلیسمی اتفاق می‌افتد، بنابراین نشانگر بسیار حساسی برای تشخیص زود هنگام افزایش قند خون است (۴۵). روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری 1,5-AG بزاقی وجود دارد، مانند آزمون‌های آنزیمی، اما روش کروماتوگرافی مایع-طیف‌سنجی جرمی^{۵۲} (LC-MS) دقیق‌ترین و حساس‌ترین روش شناخته می‌شود. در آزمون‌های آنزیمی مانند کیت GlycoMark™، وجود گلاکتوز به دلیل شباهت ساختاری با 1,5-AG ممکن

است باعث تداخل شود. با این حال، 1,5-AG هنوز در مرحله تحقیقاتی است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد تا به مرحله کاربرد بالینی برسد (۴۶،۴۷).

□ دیس لیپیدمی و بزاق

دیس لیپیدمی^{۵۳} وضعیتی بالینی است که در آن غلظت لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها در خون غیرطبیعی است. این حالت شامل افزایش سطح کلسترول تام^{۵۴} (TC)، تری گلیسرید^{۵۵} (TG)، لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم^{۵۶} (VLDL)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم^{۵۷} (LDL-C) یا کاهش سطح کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا^{۵۸} (HDL-C) می‌باشد. این اختلال در هموستاز چربی‌ها نقش مهمی در بروز بیماری‌های قلبی عروقی، آترواسکلروز (تصلب شرایین) و سایر اختلالات متابولیک دارد. عوامل ژنتیکی و سبک زندگی دو عامل اساسی در ایجاد دیس لیپیدمی محسوب می‌شوند. علاوه بر این، برخی از بیماری‌های زمینه‌ای مانند کم کاری تیروئید، بیماری مزمن کلیه یا مصرف برخی داروها نیز می‌توانند موجب بروز دیس لیپیدمی شوند (۴۸،۴۹). تشخیص دیس لیپیدمی بر اساس آزمایش پنل لیپیدی (Lipid Panel Test) انجام می‌شود. طبق دستورالعمل برنامه ملی آموزش کلسترول (NCEP)، نتایج زیر نشان دهنده پروفایل چربی غیر طبیعی هستند، تری گلیسرید $\geq 150 \text{ mg/dL}$ ، $\text{LDL-C} \geq 130 \text{ mg/dL}$ ، $\text{HDL-C} < 40 \text{ mg/dL}$ در مردان و در زنان $\text{HDL-C} < 50 \text{ mg/dL}$ (۵۰).

شیوع این اختلال بر اساس سن، جنسیت و وضعیت اقتصادی متفاوت است. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که بین پروفایل لیپیدی بزاق و سرم، برای شاخص‌های TC،

- 51- 1,5-Anhydroglucitol
- 52- Liquid chromatography-mass spectrometry
- 53- Dyslipidemia
- 54- Total cholesterol
- 55- Triglyceride
- 56- Very-low-density lipoprotein
- 57- Low-density lipoprotein
- 58- High-density lipoprotein



VLDL، TG و HDL-C همبستگی متوسطی وجود دارد؛ اما این همبستگی برای LDL-C ضعیف‌تر گزارش شده است. از این رو، بررسی پروفایل لیپیدی بزاق بیماران می‌تواند برای تشخیص دیس لیپیدمی یا حتی پیش بینی بیماری‌های قلبی عروقی به کار رود. با این حال، نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد تا دستورالعملی جامع برای استفاده بالینی از این آزمون در آینده تدوین شود (۵۲، ۵۱).

□ بیماری کبد چرب غیرالکلی و بزاق

بیماری کبد چرب غیرالکلی^{۵۹} (NAFLD) به عنوان وضعیتی تعریف می‌شود که در آن بیش از ۵٪ از سلول‌های کبدی (هپاتوسیت‌ها) دچار نفوذ چربی درون سلولی می‌شوند، بدون آن که مصرف قابل توجه الکل، تجمع ثانویه چربی در کبد یا سایر بیماری‌های مزمن کبدی وجود داشته باشد. بیماری کبد چرب غیرالکلی شامل طیفی از اختلالات است که از استئاتوز^{۶۰} ساده (یعنی تنها تجمع چربی در کبد) آغاز می‌شود و ممکن است به استئاتوهپاتیت غیرالکلی^{۶۱} (NASH) پیشرفت کند، حالتی که در آن تجمع چربی همراه با آسیب سلولی، التهاب و نکروز هپاتوسیتی است (۵۳). در صورت عدم درمان، این وضعیت می‌تواند منجر به فیروز پیشرفته، سیروز یا کارسینوم سلول‌های کبدی^{۶۲} شود. بر اساس مطالعات، شیوع جهانی بیماری کبد چرب غیرالکلی حدود ۲۵٪ گزارش شده است. پاتوژنز این بیماری ارتباط نزدیکی با مقاومت به انسولین، چاقی، دیس لیپیدمی

و اختلالات مرتبط با سندرم متابولیک دارد؛ عواملی که باعث افزایش ورود چربی به کبد، افزایش لیپوژنز درون ز^{۶۳}، اختلال در اکسیداسیون یا ترشح چربی‌ها و در نهایت آسیب لیپوتوکسیک به سلول‌های کبدی می‌شوند (۵۴).

در حال حاضر، برای تشخیص بیماری کبد چرب غیرالکلی از روش‌های تصویر برداری مانند الاستوگرافی گذرا^{۶۴} (مانند FibroScan)، تصویر برداری تشدید مغناطیسی^{۶۵} (MRI)، الاستوگرافی تشدید مغناطیسی^{۶۶} (MRE)، همراه با بررسی آنزیم‌های کبدی (ALT، AST و ALP) استفاده می‌شود. با این حال، استاندارد طلایی تشخیص بیماری کبد چرب غیرالکلی، نمونه برداری از کبد^{۶۷} است (۵۵، ۵۶).

۱- مونواستئارین^{۶۸} یا ۱-گلیسرول مونواستئارات^{۶۹}، یک استر حاصل از اسید استئاریک و گلیسرول است. در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی، مقاومت به انسولین موجب آزاد شدن اسیدهای چرب آزاد از بافت چربی می‌شود. این اسیدهای چرب آزاد توسط هپاتوسیت‌ها جذب و مجدداً به شکل تری آسایل گلیسرول (TAG) استریفیه می‌شوند. در صورت اختلال در فرآیند β -اکسیداسیون، ۱-مونواستئارین در سلول‌های کبدی تجمع می‌یابد (۵۷). افزایش سطح ۱-مونواستئارین در نمونه‌های بزاقی بیماران بیماری کبد چرب غیرالکلی در مقایسه با افراد سالم گزارش شده است، با این حال، این متابولیت نشانگر اختصاصی برای تشخیص بیماری کبد چرب غیرالکلی محسوب نمی‌شود و نیاز به مطالعات بیشتری برای تأیید نقش تشخیصی

- 59- Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
- 60- Steatosis
- 61- Nonalcoholic steatohepatitis
- 62- Hepatocellular Carcinoma
- 63- De novo lipogenesis
- 64- Transient Elastography
- 65- Magnetic Resonance Imaging
- 66- Magnetic resonance elastography
- 67- Liver Biopsy
- 68- 1-monostearin
- 69- 1-glycerol monostearate



آن وجود دارد (۵۸). در یک مطالعه دیگر که توسط Zyśk و همکارانش، غلظت ماتریکس متالوپروتئیناز^{۷۰۹} (MMP-9)، رزیستین^{۷۱} و IL-1 β در بزاق افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی افزایش داشت و ارتباط مستقیمی بین استئاتوز کبدی و غلظت MMP-2، رزیستین و IL-1 β در بزاق و همچنین میان غلظت رزیستین در بزاق و غلظت ALT و GGTP در سرم یافت شد. بر اساس نتایج این مطالعه IL-1 β ، MMP-2 و رزیستین می‌توانند نشانگرهای بالقوه شناسایی بیماری کبد چرب غیرالکلی در نمونه بزاق باشند (۵۹).

□ فشاری خون و بزاق

فشاری خون^{۷۲} یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن در سراسر جهان است که به عنوان یک عامل خطر اصلی برای بیماری‌های قلبی-عروقی، سکته مغزی و نارسایی کلیوی شناخته می‌شود. این بیماری معمولاً به صورت افزایش مداوم فشار سیستولیک (بیش از ۱۳۰ میلی‌متر جیوه) یا دیاستولیک (بیش از ۸۰ میلی‌متر جیوه) تعریف می‌گردد. پاتوفیزیولوژی پرفشاری خون پیچیده است و شامل عوامل ژنتیکی، محیطی، تغذیه‌ای، هورمونی و التهابی می‌شود (۶۰).

پژوهش‌های جدید نشان داده‌اند که تغییر در ترکیبات بزاق می‌تواند با فرآیندهای پاتوفیزیولوژیک پرفشاری خون مرتبط باشد. پرفشاری خون یک بیماری التهابی سطح پایین مزمن محسوب می‌شود که در آن فعال‌سازی سیستم ایمنی، آسیب اندوتلیال و افزایش سیتوکاین‌ها نقش کلیدی دارند.

مطالعات نشان داده‌اند، IL-1 β و NLRP3 در بزاق بیماران مبتلا به پرفشاری خون (به ویژه همراه با پریدنتیت) افزایش معنی داری دارند. سطح پروتئین‌های التهابی مانند CRP، TNF- α و IL-6 نیز در بزاق افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی (و در برخی مطالعات، پرفشاری خون) بالا گزارش شده است. افزایش لیزوزیم بزاقی با احتمال بالاتر ابتلا به پرفشاری خون مرتبط دانسته شده است. این آنزیم در پاسخ به عفونت‌های دهانی و التهاب افزایش می‌یابد و می‌تواند منعکس‌کننده وضعیت سیستمیک بدن باشد (۶۳-۶۱). استرس‌های روانی و فیزیولوژیک از عوامل مهم افزایش فشار خون هستند. بزاق شاخص‌های متعددی از محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال را منعکس می‌کند. کورتیزول^{۷۳} بزاقی یکی از پرکاربردترین بیومارکرهای غیرتهاجمی برای ارزیابی استرس است. مطالعات نشان داده‌اند که افزایش سطح کورتیزول بزاقی با بالا رفتن فشار خون و تغییرات ضربان قلب همراه است. آلفا آمیلاز^{۷۴} بزاقی نیز به عنوان شاخصی از فعالیت سمپاتیک شناخته می‌شود و در افراد مبتلا به پرفشاری خون مقادیر بالاتری نشان داده است (۶۵،۶۴).

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که میکروبیوم دهانی ممکن است نقش غیر مستقیمی در تنظیم فشار خون ایفا کند. برخی از باکتری‌های دهانی قادر به تولید نیتريت هستند که در بدن به نیتريك اكسيد (NO) تبدیل می‌شود؛ مولکولی که باعث گشاد شدن عروق و کاهش فشار خون می‌گردد. دیسبیوزیس^{۷۵} میکروبی بزاق می‌تواند این تعادل را برهم زند و در افزایش فشار خون نقش داشته باشد (۶۶).

70- Matrix Metalloprotease 9

71- Resistin

72- Hypertension

73- Cortisol

74- Alpha Amylase

75- Dysbiosis

References:

- 1- Abdul NS, AlGhannam SM, Almughaiseb AA, Bindawood FA, alduraibi SM, Shenoy M. A review on salivary constituents and their role in diagnostics. *Bioinformation*. 2022 Oct 31;18(10):1021–8.
- 2- Kumari S, Samara M, Ramachandran RA, Gosh S, George H, Wang R, et al. A Review on Saliva-Based Health Diagnostics: Biomarker Selection and Future Directions. *Biomed Mater Devices N Y N*. 2023 June 6;1.
- 3- Schwerdt G, Schulz MC, Kopf M, Mildnerberger S, Reime S, Gekle M. Physiological regulation of oral saliva ion composition and flow rate are not coupled in healthy humans—Partial revision of our current knowledge required. *Pflügers Arch*. 2025;477(1):55–65.
- 4- Al Shaar A, Hamadeh O, Ali A. Saliva and serum biomarkers in oral diseases: A case-control study. *Medicine (Baltimore)*. 2024 Dec 27;103(52):e41072.
- 5- Zhang CZ, Cheng XQ, Li JY, Zhang P, Yi P, Xu X, et al. Saliva in the diagnosis of diseases. *Int J Oral Sci*. 2016 Sept;8(3):133–7.
- 6- Shah S. Salivaomics: The current scenario. *J Oral Maxillofac Pathol JOMFP*. 2018;22(3):375–81.
- 7- Papale F, Santonocito S, Polizzi A, Giudice AL, Capodiferno S, Favia G, et al. The New Era of Salivaomics in Dentistry: Frontiers and Facts in the Early Diagnosis and Prevention of Oral Diseases and Cancer. *Metabolites*. 2022 July 12;12(7):638.
- 8- Das S, Basak S, Sarkar S. Decoding Salivary ncRNAs as Novel Biomarkers for Oral Cancer Detection and Prognosis. *Non-Coding RNA*. 2025 Mar 20;11(2):28.
- 9- Li Y, Ou Y, Fan K, Liu G. Salivary diagnostics: opportunities and challenges. *Theranostics*. 2024 Oct 21;14(18):6969–90.
- 10- Fahed G, Aoun L, Bou Zerdan M, Allam S, Bou Zerdan M, Bouferma Y, et al. Metabolic Syndrome: Updates on Pathophysiology and Management in 2021. *Int J Mol Sci*. 2022 Jan 12;23(2):786.
- 11- Ijaz A, Abbas S, Shabbir M, Badshah Y, Abid F, Afsar T, et al. Inherited metabolic disorders: presentation, clinical types, laboratory diagnosis and genetic markers. *Orphanet J Rare Dis*. 2025 Aug 11;20:422.
- 12- Valladares AC, Astudillo MA, Drinnon AR, Dowlatshahi S, Kansara A, Shakil J, et al. Medical Management of Obesity: Current Trends and Future Perspectives. *Methodist DeBakey Cardiovasc J*. 21(2):62–73.
- 13- Hegazi R, Halpem B. Looking beyond fat in obesity: the frequently overlooked importance of muscle mass. *Rev Endocr Metab Disord*. 2025;26(5):719–21.
- 14- Wu Y, Li D, Vermund SH. Advantages and Limitations of the Body Mass Index (BMI) to Assess Adult Obesity. *Int J Environ Res Public Health*. 2024 June 10;21(6):757.
- 15- India Aldana S, Valvi D, Joshi A, Lucchini RG, Placidi D, Petrick L, et al. Salivary Metabolomic Signatures and Body Mass Index in Italian Adolescents: A Pilot Study. *J Endocr Soc*. 2023 July 1;7(8):bvad091.
- 16- Habobe HA, Pieters RHH, Bikker FJ. Investigating the Salivary Biomarker Profile in Obesity: A Systematic Review. *Curr Obes Rep*. 2025;14(1):25.
- 17- Selvaraju V, Babu JR, Geetha T. Multiplexed measurements of salivary fetuin-A, insulin, and adiponectin as potential non-invasive biomarkers in childhood obesity. *Cytokine*. 2022 May 1;153:155843.
- 18- Sabella FM, Katzenelson RT, de Carvalho FG, Duque C, Darrieux M, Marson FAL, et al. Exploring Salivary Biomarkers in Pediatric Obesity: A Scoping Review. *Int J Mol Sci*. 2025 June 17;26(12):5789.
- 19- Alqaderi H, Hegazi F, Al-Mulla F, Chiu CJ, Kantarci A, Al-Ozairi E, et al. Salivary Biomarkers as Predictors of Obesity and Intermediate Hyperglycemia in Adolescents. *Front Public Health*. 2022 June 10;10:800373.
- 20- Pirscean C, Nețuț C, Stefan-van Staden RI, Dinu-Pirvu CE, Armean P, Udeanu DI. The salivary levels of leptin and interleukin-6 as potential inflammatory markers in children obesity. *PLoS ONE*. 2019 Jan 3;14(1):e0210288.
- 21- Zysk B, Ostrowska L, Smarkusz-Zarzecka J. Salivary Adipokine and Cytokine Levels as Potential Markers for the Development of Obesity and Metabolic Disorders. *Int J Mol Sci*. 2021 Oct 28;22(21):11703.
- 22- Sabella FM, Katzenelson RT, de Carvalho FG, Duque C, Darrieux M, Marson FAL, et al. Exploring Salivary Biomarkers in Pediatric Obesity: A Scoping Review. *Int J Mol Sci*. 2025 June 17;26(12):5789.
- 23- Mallardo M, D'Alleva M, Lazzar S, Giovannelli N, Graniero F, Billat V, et al. Improvement of adiponectin in relation to physical performance and body composition in young obese males subjected to twenty-four weeks of training programs. *Heliyon*. 2023 Apr 28;9(5):e15790.
- 24- Hernández-Gómez KG, Avila-Nava A, González-Salazar LE, Noriega LG, Serralde-Zúñiga AE, Guizar-Heredia R, et al. Modulation of MicroRNAs and Exosomal MicroRNAs after Dietary Interventions for Obesity and Insulin Resistance: A Narrative Review. *Metabolites*. 2023 Dec 7;13(12):1190.
- 25- Benavides-Aguilar JA, Torres-Copado A, Isidoro-Sánchez J, Pathak S, Duttaray AK, Banerjee A, et al. The Regulatory Role of MicroRNAs in Obesity and Obesity-Derived Ailments. *Genes*. 2023 Nov 13;14(11):2070.
- 26- Röhrborn K, Hoffmann A, Lorenz A, Kovacs P, Hagemann T, Czechowski P, et al. Salivary extracellular vesicle-derived microRNAs are related to variances in parameters of obesity, taste and eating behaviour. *Mol Metab*. 2025 Oct 3;102:102265.
- 27- Osés M, Margareto Sanchez J, Portillo MP, Aguilera CM, Labayen I. Circulating miRNAs as Biomarkers of Obesity and Obesity-Associated Comorbidities in Children and Adolescents: A Systematic Review. *Nutrients*. 2019 Nov 27;11(12):2890.
- 28- Abdalla MMI, Choo SS. The Association Between Salivary Ghrelin Levels with Anthropometric Measures in Underweight, Normal, Overweight and Obese Healthy Adult Males. *Eur Endocrinol*. 2020 Apr;16(1):49–53.
- 29- Potempa-Jeziorowska MK, Jonczyk P, Świętochowska E, Kuchazewski M. Analysis of ghrelin, leptin, and interleukin-6 salivary concentration among children aged 7–10 years and its relationship with nutritional status and some anthropometric data. *Pediatr Endocrinol Diabetes Metab*. 2022 Dec;28(4):263–73.
- 30- Dongiovanni P, Meroni M, Casati S, Goldoni R, Thomaz DV, Kehr NS, et al. Salivary biomarkers: novel noninvasive tools to diagnose chronic inflammation. *Int J Oral Sci*. 2023 June 29;15:27.
- 31- Cui Y, Zhang H, Wang S, Lu J, He J, Liu L, et al. Obtaining a Reliable Diagnostic Biomarker for Diabetes Mellitus by Standardizing Salivary Glucose Measurements. *Biomolecules*. 2022 Sept 21;12(10):1335.
- 32- Agho ET, Owoade FI, Kolawole BA, Oyetola EO, Adedeji TA. Salivary inflammatory biomarkers and glycated haemoglobin among patients with type 2 diabetic mellitus. *BMC Oral Health*. 2021 Mar 6;21:101.
- 33- Sacks DB, Arnold M, Bakris GL, Bruns DE, Horvath AR, Lemmark Å, et al. Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. *Clin*





Chem. 2023 July 20;69(8):808–68.

- 34- Rodacki M, Zajdenverg L, da Silva Júnior WS, Giacaglia L, Negrato CA, Cobas RA, et al. Brazilian guideline for screening and diagnosis of type 2 diabetes: a position statement from the Brazilian Diabetes Society. *Diabetol Metab Syndr*. 2025 Mar 4;17:78.
- 35- Butler AE, English E, Kilpatrick ES, Östlundh L, Chemaitelly HS, Abu-Raddad LJ, et al. Diagnosing type 2 diabetes using Hemoglobin A1c: a systematic review and meta-analysis of the diagnostic cutpoint based on microvascular complications. *Acta Diabetol*. 2021;58(3):279–300.
- 36- Cenzato N, Cazzaniga F, Maspero C, Tartaglia GM, Del Fabbro M. SALIVA-based diagnostic approach for diabetes mellitus: a step towards non-invasive detection - a scoping review. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2023 Dec;27(24):12080–7.
- 37- Gupta S, Nayak MT, Sunitha J, Dawar G, Sinha N, Rallan NS. Correlation of salivary glucose level with blood glucose level in diabetes mellitus. *J Oral Maxillofac Pathol JOMFP*. 2017;21(3):334–9.
- 38- Cui Y, Zhang H, Zhu J, Liao Z, Wang S, Liu W. Correlations of Salivary and Blood Glucose Levels among Six Saliva Collection Methods. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Mar 30;19(7):4122.
- 39- Pérez-Ros P, Navarro-Flores E, Julián-Rochina I, Martínez-Arnau FM, Cauli O. Changes in Salivary Amylase and Glucose in Diabetes: A Scoping Review. *Diagnostics*. 2021 Mar 6;11(3):453.
- 40- Kandavel S, Kumar PDM. Association between Salivary Fructosamine, Plasma Glycated Hemoglobin, and Plasma Glucose Levels among Type II Diabetes Mellitus and Nondiabetic Individuals—A Cross-sectional Study. *Eur J Dent*. 2019 July;13(3):310–7.
- 41- Patel H, NA. Comparative analysis of fructosamine and HbA1c as a glycemic control marker in Type 2 diabetes patients in a tertiary care hospital study. *Asian J Med Sci*. 2023 Oct 2;14(10):73–8.
- 42- Ambili R, Aathira V, Ashni AR, Bajju KV. Salivary fructosamine in diabetic and non-diabetic individuals with healthy and diseased periodontium and its changes after non-surgical periodontal therapy. *Acta Diabetol*. 2025 Jan;62(1):59–66.
- 43- Danese E, Montagnana M, Nouvenne A, Lippi G. Advantages and Pitfalls of Fructosamine and Glycated Albumin in the Diagnosis and Treatment of Diabetes. *J Diabetes Sci Technol*. 2015 Jan 14;9(2):169–76.
- 44- Kedamath PS, Subramanian SS, Bhaskar E, Kasi M, Pillai V, Subramanian S, et al. Salivary 1,5-Anhydroglucitol and its Correlation with Postprandial Hyperglycemia: Development and Validation of a Novel Assay. *Int J Appl Basic Med Res*. 2023;13(1):23–8.
- 45- Brognara L, Sempere-Bigorra M, Cauli O. Salivary 1,5-Anhydroglucitol and AGEs Are Associated with Postural Instability in Diabetic Foot Patients. *Medicina (Mex)*. 2025 May 23;61(6):968.
- 46- Jian C, Zhao A, Ma X, Ge K, Lu W, Zhu W, et al. Diabetes Screening: Detection and Application of Saliva 1,5-Anhydroglucitol by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. *J Clin Endocrinol Metab*. 2020 June 1;105(6):dgaa114.
- 47- Ying L, Jian C, Ma X, Ge K, Zhu W, Wang Y, et al. Saliva 1,5-anhydroglucitol is associated with early-phase insulin secretion in Chinese patients with type 2 diabetes. *BMJ Open Diabetes Res Care*. 2021 June 24;9(1):e002199.
- 48- de Oliveira LLH, de Assis ACR, Giraldez VZR, Scudeler TL, Soares PR. Dyslipidemia: A Narrative Review on Pharmacotherapy. *Pharmaceuticals*. 2024 Feb 23;17(3):289.
- 49- Mohamed-Yassin MS, Baharudin N, Abdul-Razak S, Ramli AS, Lai NM. Global prevalence of dyslipidaemia in adult populations: a systematic review protocol. *BMJ Open*. 2021 Dec 3;11(12):e049662.
- 50- Pappan N, Awosika AO, Rehman A. Dyslipidemia. In: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [cited 2025 Nov 7]. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560891/>
- 51- Abodi M, Mazzocchi A, Risé P, Marangoni F, Agostoni C, Milani GP. Salivary fatty acids in humans: a comprehensive literature review. *Clin Chem Lab Med*. 2025 Jan 29;63(1):14–26.
- 52- Singh V, Patil R, Singh S, Tripathi A, Khanna V, Ali W. Diagnostic significance of serum and salivary lipid levels in oral precancer and oral cancer. *Natl J Maxillofac Surg*. 2021;12(2):188–92.
- 53- Daniels NJ, Hershberger CE, Kerosky M, Wehrle CJ, Raj R, Aykun N, et al. Biomarker Discovery in Liver Disease Using Untargeted Metabolomics in Plasma and Saliva. *Int J Mol Sci*. 2024 Sept 21;25(18):10144.
- 54- Powell EE, Wong VWS, Rinella M. Non-alcoholic fatty liver disease. *Lancet Lond Engl*. 2021 June 5;397(10290):2212–24.
- 55- Leung PB, Davis AM, Kumar S. Diagnosis and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *JAMA*. 2023 Nov 7;330(17):1687–8.
- 56- Arnold MJ. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Diagnosis and Management Guidelines From the AACE. *Am Fam Physician*. 2023 May;107(5):554–6.
- 57- Cetin EG, Demir N, Sen I. The Relationship between Insulin Resistance and Liver Damage in non-alcoholic Fatty Liver Patients. *Med Bull Sisli Etfal Hosp*. 2020 Dec 11;54(4):411–5.
- 58- Daniels NJ, Hershberger CE, Kerosky M, Wehrle CJ, Raj R, Aykun N, et al. Biomarker Discovery in Liver Disease Using Untargeted Metabolomics in Plasma and Saliva. *Int J Mol Sci*. 2024 Sept 21;25(18):10144.
- 59- Zysk B, Ostrowska L, Smarkusz-Zarzecka J, Witczak-Sawczuk K, Gomowicz A, Bielawska A. Pro-Inflammatory Adipokine and Cytokine Profiles in the Saliva of Obese Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)—A Pilot Study. *Int J Mol Sci*. 2023 Feb 2;24(3):2891.
- 60- Chuang S, Cheng H, Chang W, Yeh W, Huang C, Chen C. 130/80 mmHg as a unifying hypertension threshold for office brachial, office central, and ambulatory daytime brachial blood pressure. *J Clin Hypertens*. 2023 Feb 7;25(3):266–74.
- 61- Bolyarova T, Stefanov L, Naseva E, Stamatov K, Dzhakov S, Stoimenov B, et al. Pro-Inflammatory Markers in Serum and Saliva in Periodontitis and Hypertension. *Medicina (Mex)*. 2025 May 31;61(6):1024.
- 62- Lee KT, Guo ZL, Teng NC, Hsu KLC, Chen IH, Lee CY, et al. Salivary Pro-Inflammatory Markers and Smoking Status Influences the Treatment Effectiveness of Periodontal Disease Patients with Hypertension. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 July 9;18(14):7364.
- 63- Gohel V, Jones JA, Wehler CJ. Salivary biomarkers and cardiovascular disease: a systematic review. *Clin Chem Lab Med*. 2018 Aug 28;56(9):1432–7.
- 64- An K, Salyer J, Brown RE, Kao HFS, Starkweather A, Shim I. Salivary Biomarkers of Chronic Psychosocial Stress and CVD Risks: A Systematic Review. *Biol Res Nurs*. 2016 May;18(3):241–63.
- 65- Ikeda A, Steptoe A, Brunner EJ, Maruyama K, Tomooka K, Kato T, et al. Salivary Alpha-Amylase Activity in Relation to Cardiometabolic Status in Japanese Adults without History of Cardiovascular Disease. *J Atheroscler Thromb*. 2021 Aug 1;28(8):852–64.
- 66- Murugesan S, Al Khodor S. Salivary microbiome and hypertension in the Qatari population. *J Transl Med*. 2023 July 8;21:454.

